



L'irrigation vésicale

Intitulé de la fiche	L'irrigation vésicale
Point(s) critique(s)	Toutes manipulations relatives au sondage vésical peuvent induire un risque majeur de transmission croisée d'agents biologiques.
Fiche à destination de	Unités de soins du Groupe santé CHC
Validation de l'information	✓ HOST MOVE ✓ PCI MOVE Date de la validation : le 1.02.2024
Références bibliographiques	- Recommandations en matière de prévention, maîtrise et prise en charge des infections urinaires au cours des soins, CSS N° 8889, juillet 2017 - https://www.hug.ch/procedures-de-soins/rincage-de-vessie , HUG 2014
Fiche réalisée par	PCI HOST MOVE

Précisions préalables

- ✓ Afin de limiter le risque d'infection urinaire sur sonde vésicale à 2 voies, le système clos doit être respecté
- ✓ L'instillation vésicale se réalise sur prescription médicale uniquement
- ✓ Cette procédure est donc mise à disposition pour répondre aux besoins de situations particulières et reste exceptionnelle

Indications à l'irrigation vésicale

- ✓ L'hématurie
- ✓ La formation de mucus
- ✓ La chirurgie de la prostate ou de la vessie

Critères qualité

	✓	✗
Le patient est installé sur un revêtement propre	✓	✗
Le soignant réalise une hygiène des mains avant le soin	✓	✗
Le soignant porte des gants à usage unique non stérile	✓	✗
Une toilette intime rigoureuse est réalisée avant le début du soin (savon neutre liquide), essuie et gant de toilette propres	✓	✗
Le soignant réalise une hygiène des mains après retrait des gants	✓	✗
La technique de l'instillation respecte une aseptie rigoureuse	✓	✗
En cas d'une sonde vésicale à 2 voies, déconnexion de la sonde en désinfectant la jonction (sonde vésicale – collecteur d'urine) avec une compresse imbibée d'une solution antiseptique (Chlorhexidine alcool 2% au CHC et ST-Vith et 0,5% Eupen)	✓	✗
Le matériel et les produits injectés sont stériles	✓	✗
L'embout du sac collecteur est maintenu stérile (compresse stérile imbibée de Chlorhexidine alcool)	✓	✗
Après l'instillation, la sonde est directement raccordée stérilement à un nouveau sac collecteur stérile	✓	✗
Le sac collecteur est maintenu en position déclive par rapport à la vessie sans contact au sol	✓	✗
Le sac collecteur usagé est éliminé dans les déchets de soins après vidange	✓	✗
Fixation de la sonde sur la cuisse et sur l'abdomen chez l'homme allité permettant de réduire les lésions urétrales	✓	✗
Hygiène des mains après le soin	✓	✗



Blasenspülung

Titel der Karteikarte	Die Blasenspülung
Kritische(r) Punkt(e)	Die Handhabung von Blasenkathetern birgt ein hohes Risiko der Übertragung von Krankheitserregern.
Merkblatt an	Pflegeeinheiten des CHC
Validierung von Informationen	✓ HOST MOVE ✓ PCI MOVE Datum der Validierung: 1.02.2024
Bibliografische Referenzen	- Recommandation en matière de prévention, maîtrise et prise en charge des infections urinaires au cours des soins, CSS N° 8889, juillet 2017 - https://www.hug.ch/procedures-de-soins/rincage-de-vessie , HUG 2014
Karteikarte erstellt von	PCI HOST MOVE

Précisions préalables

- ✓ Um das Risiko einer Harnwegsinfektion bei einem 2-Wege-Blasenkatheter zu begrenzen, muss das geschlossene System eingehalten werden
- ✓ Die Blaseninstillation wird nur auf ärztliche Anordnung durchgeführt.
- ✓ Dieses Verfahren wird also zur Verfügung gestellt, um den Bedürfnissen besonderer Situationen gerecht zu werden, und bleibt die Ausnahme

Indikationen für die Blasenspülung

- ✓ Hämaturie
- ✓ Die Bildung von Schleim
- ✓ Chirurgie der Prostata oder der Blase

Qualitätskriterien	✓	✗
Der Patient wird auf eine saubere Unterlage installiert.		
Die Pflegekraft führt vor der Pflege eine Händehygiene durch		
Die Pflegekraft trägt unsterile Einmalhandschuhe.		
Vor Beginn der Pflege wird eine gründliche Intimtoilette durchgeführt (flüssige neutrale Seife), sauberes Handtuch und Waschlappen.		
Die Pflegekraft führt nach dem Ausziehen der Handschuhe eine Händehygiene durch.		
Bei der Instillationstechnik wird eine strenge Asepsis eingehalten		
Bei einem 2-Wege-Blasenkatheter den Katheter abtrennen, indem die Verbindung desinfiziert wird (Blasenkatheter - Sammelbeutel) mit einer mit antiseptischer Lösung getränkten Kompresse (Chlorhexidin Alkohol 2% im CHC und in St-Vith und 0,5% und Eupen).		
Das Material und die injizierten Produkte sind steril		
Die Spitze des Sammelbeckens steril aufbewahren (sterile, mit Chlorhexidin-Alkohol getränkte Kompresse)		
Nach der Instillation wird die Sonde direkt steril an einen neuen sterilen Sammelbeutel angeschlossen.		
Der Sammelbeutel wird ohne Bodenkontakt in Relation zur Blase in einer abschüssigen Position gehalten.		
Den alten Sammelbeutel nach Entleerung im Pflegeabfall entsorgen		
Durch die Fixierung des Katheters am Oberschenkel und am Bauch bei bettlägerigen Männern können Harnröhrenverletzungen reduziert werden.		
Händehygiene nach der Pflege		