

Prescription de Fluoroquinolones : tenez-vous compte des risques ?

De par leurs effets secondaires et leurs contre-indications, les FQ possèdent un profil de sécurité défavorable :

Effets secondaires, dont certains peuvent être invalidants et irréversibles

- ✓ Troubles musculo-squelettiques, tendinopathies
- ✓ Neuropathies périphériques
- ✓ Troubles du rythme cardiaque : bradycardie, torsade de pointe (allongement de l'intervalle QT)
- ✓ Anévrisme et dissection aortique, en particulier chez les sujets âgés ou patients avec FR Régurgitation/insuffisance des valves cardiaques
- ✓ Troubles neuropsychiatriques
- ✓ Hépato toxicité
- ✓ Colites infectieuse à *Clostridioïdes difficile*
- ✓ Photosensibilisation (érythèmes diffus, photo-allergie)

Contre-indications

- ✓ Antécédents de réactions allergiques aux FQ,
- ✓ Antécédents de tendinopathies,
- ✓ Epilepsie (risque accru de convulsions) ou utilisation concomitante d'autres médicaments susceptibles de provoquer des convulsions
- ✓ Prédisposition aux troubles du rythme cardiaque : allongement de l'intervalle QT congénital et **iatrogène** (! aux thérapies concomitantes)
- ✓ Grossesse, allaitement



Avant de prescrire une Fluoroquinolone,

- ✓ Tenez compte du rapport bénéfice-risque potentiel, selon les facteurs de risques du patient
- ✓ Assurez-vous qu'il n'existe aucune alternative antibiotique adéquate et sensible

Pour plus d'information,

- ✓ https://www.afmps.be/fr/news/prac_mai_2023_restrictions_en_matiere_dutilisation_des_fluoroquinolones_et_nouvelles
- ✓ onepage « Règle de prescription »



Verschreibung von Fluorchinolonen: Berücksichtigen Sie die Risiken?

Aufgrund ihrer Nebenwirkungen und Kontraindikationen haben FQ ein ungünstiges Sicherheitsprofil:

Nebenwirkungen, von denen einige beeinträchtigend und irreversibel sein können

- ✓ Muskel-Skelett-Beschwerden, Tendopathien
- ✓ Periphere Neuropathien
- ✓ Herzrhythmusstörungen: Bradykardie, Tachykardie (Verlängerung des QT-Intervalls)
- ✓ Aortenaneurysma und -dissektion, insbesondere bei älteren Menschen oder Patienten mit Risikofaktoren Herzklappeninsuffizienz /-regurgitation
- ✓ Neuropsychiatrische Störungen
- ✓ Hepato Toxizität
- ✓ Infektiöse Kolitis durch *Clostridioides difficile*
- ✓ Photosensibilisierung (diffuse Erytheme, Photoallergie)

Kontraindikationen

- ✓ Allergische Reaktionen auf FQ in der Vorgeschichte
- ✓ Tendopathien in der Vorgeschichte
- ✓ Epilepsie (erhöhtes Risiko von Krampfanfällen) oder gleichzeitige Einnahme anderer Medikamente, die Krampfanfälle auslösen können
- ✓ Veranlagung zu Herzrhythmusstörungen: angeborene und **iatrogene** QT-Verlängerung (! bei Begleittherapien)
- ✓ Schwangerschaft, Stillzeit



Bevor Sie Fluorochinolon verschreiben,

- ✓ berücksichtigen Sie das potenzielle Nutzen-Risiko-Verhältnis, gemäß der Risikofaktoren des Patienten
- ✓ stellen Sie sicher, dass es keine geeigneteren und sensiblere Antibiotika-Alternative gibt.

Weitere Informationen:

- ✓ https://www.afmps.be/fr/news/prac_mai_2023_restrictions_en_matiere_dutilisation_des_fluoroquinolones_et_nouvelles
- ✓ onepage « Règle de prescription »/«Arzneimittel-verschreibungsverordnung»

